

カビ・コケ・藻除去剤（即効タイプ）

まぜるな危険!
酸性タイプの製品と一緒に使う（まぜる）と
塩素ガスが出て**危険**です。
（アルカリ性タイプ）

カビコケモ

カビコケモの使用方法及び使用上の注意につきましては、施行要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。
最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。<https://www.miyaki.com>


特 長

■ 即効性があり作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。

用 途

- コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。
- ※ 塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。
- コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。

対 象 施 工 面 (例)



使用上の注意（抜粋）

- 必ず**屋外または十分に換気された場所でのみ**ご使用ください。
- 体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患等の方は絶対に使用しないでください。
- 人体に害がありますので、**吸引したり飲んだりしないでください。眼に入ると危険**です（失明する恐れがあります）。**皮膚に損傷を与える**恐れがあります。必ず適切な保護具（保護マスク・防毒マスク・保護メガネ・ゴーグル・保護面・ゴム手袋・ゴム製の保護衣等）をお使いください。
- **酸性タイプ**の製品を混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると**塩素ガスが出て危険**です。特に、室内・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガス中毒になる恐れがあります。ご注意ください。

除 去 効 果

■ 外壁面に発生したカビ・コケ・藻の除去。



施工前



施工後

殺カビ性データ（参考文献値）

本製品は次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度 5.0%相当の洗浄剤になります。
各種カビに対する殺カビ効果（参考文献値）を以下に示します。
尚、下記データはあくまで参考値であり、本製品の効果を保証するものではありません。

次亜塩素酸ナトリウムの殺カビ効果¹⁾

カビ	殺カビに要した曝露時間（分）				
	有効塩素濃度（%）				
	0.1	0.5	1.0	2.0	5.0
<i>Chaetomium globosum</i>	180 以上*	180 以上	180 以上	180 以上	90.0
<i>Cladosporium cladosporioides</i>	180 以上	180 以上	120	30	0.5
<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	180 以上	180 以上	120	60	0.5
<i>Aspergillus niger</i>	180 以上	180 以上	180	30	0.5
<i>Eurorium chevalieri</i>	180 以上	180 以上	180 以上	90	0.5
<i>Fusarium oxysporum</i>	180 以上	180 以上	180	30	0.5
<i>Paecilomyces variotii</i>	180 以上	180 以上	120	30	0.5
<i>Penicillium aurantiogriseum</i>	180 以上	180 以上	180	60	0.5

*0.5、1、1.5、2、3、4、5、10、15、30、60、90、120、180 分間隔で曝露した時の殺カビに要した時間

【参考文献】

1) 高鳥浩介・村松芳多子・文化財にみる有害カビ - 有害カビの制御 - 文化財の虫菌害 No.64. 2012, 12, p. 4-12

業務用

40・180



詳しくはこちら
ミヤキホームページ

製品有効期限：未開封冷暗所保管で製造より6ヶ月

標準使用量（原液使用時） 5～10ml/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。



株式会社ミヤキ

■ 取扱店

2023.03

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
<https://www.miyaki.com>

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二
東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一
大阪第二、広島、福岡

